


“2024 YILI HASADINA DOĐRU TÖRKİYE VE DÖNYADA TAHİL”

10 MAYIS 2024

GÖRSEL ERBAP

Doruk Un San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı





Trakya bölgesi, Türkiye'nin kuzey batısında 40 ile 42 derece kuzey enlemleri ve 26 ile 29 derece doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Bu bölge Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tamamı ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa tarafında kalan kısmını içine almaktadır. Bu bölgenin yüzölçümü 2.476.000 ha'dır. Bunun 1.225.000 ha.'da kuru, yaklaşık 160.000 ha'da sulu koşullarda tarım yapılmaktadır. Bölgenin ortalama yağışı 600 mm civarındadır. İç kısımlar daha az yağış almakta ve yer yer kara iklimi görülmektedir.

Yıllık yağışın %35' i Kış, %25' i ilkbahar, %27' si Sonbahar ve %13' ü de Yaz mevsiminde düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.4 °C'dir. Bölgede en düşük sıcaklık -22.2 °C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise 40.8 °C ile Ağustos ayında ölçülmüştür. Yıllık ortalama nispi nem %73'tür. Trakya'da donlu günler sayısı 30 ile 90 arasında değişmektedir.

Trakya'nın kara iklimine en yakın yeri olan Lüleburgaz'da geç donlar 28 Nisan'a kadar olabilmekte, erken donlar ise 9 Ekim'de başlayabilmektedir.

MARMARA BÖLGESİ GENEL DURUM

Marmara bölgesinde yıldan yıla değışmekle ekim alaları ve verimleri aşığıdaki gibidir.

Ürün	Üretim Alanı Dekar	Verim Kg/Dekar
Buğday	10.153.118	359
Arpa	2.267.728	368
Kanola	295.764	325
Ayçiçeğı	3.985.975	269
Çeltik	844.637	760
Arpa (Yeşil ot)	46.401	1.719

Marmara Bölgesi Türkiye buğday ekim alanlarında %18-20'sini, üretimin %21-23'ünü karşılamaktadır. Ayrıca bölgenin ortalama buğday verimi (350-400 kg/da), Türkiye ortalaması (250-300 kg/da) ile kıyaslandığında, bölge ortalamasının Türkiye ortalamasından %70-80 daha fazla olduğu görülmektedir. Bütün bu veriler, buğday tarımının bölge için önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Ürün	Üretim Miktarı Türkiye	Üretim Miktarı Marmara	Oran
Buğday	19,500,000	3,200,000	16%
Arpa	8,300,000	649,390	8%
Kanola	121,542	98,850	81%
Ayçiçeği	2,067,004	1,069,199	52%
Çeltik	980,000	668,783	68%
Arpa (Yeşil ot)	537,066	97,322	18%

Bazı yıllarda değişkenlik göstermekle birlikte bölgenin uzun yıllar yıllık yağış ortalaması yaklaşık olarak 585 mm'dir.


Yağışın yanında diğer iklim ve toprak özelliklerinin de hububat tarımı için uygun olması ve yüksek verim elde edilmesi, dolayısı ile yüksek gelir getirmesi ekmeklik buğday tarımının bölge için önemini artırmaktadır. Marmara bölgesinin toprak yapısı incelendiğinde toprak organik maddesi ve kireç kapsamının çok az olduğu görülmektedir. Özellikle toprak organik maddesi verimde çok önemli bir unsurdur. Toprak Ph'ı ve toprak yapısı yönünden genellikle istenen düzeyde olup tuzluluk yönünden de bölge topraklarında problem bulunmamaktadır. Ayrıca bölge topraklarının yaklaşık %40 fosfor bakımından yeterli düzeyde bulunduğundan gübrelemenin mutlak toprak analiz sonuçlarına göre yapılması yararlı olacaktır.

Bölgenin 2024 kış mevsimi yağışı 220.8 mm, normali 237.8 mm ve geçen yıl kış mevsimi yağışı 132.7 mm'dir. Yağışlarda mevsim normaline göre %7 azalma, geçen yıl mevsim yağışlarına göre %66 artma gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 262.6 mm ile Çanakkale, en az yağış alan il ise 162.4 mm ile Edirne oldu.

Bölgenin mart ayı yağışı 63.0 mm, normali 66.1 mm ve 2023 yılı Mart yağışı 79.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %5, 2023 yılı Mart ayı yağışına göre %20 azalma gerçekleşti




Nisan 2022 – Mart 2024 Kuraklık Haritası





2024 MART AYI ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ VE GEÇEN YIL İLE KARŞILAŞTIRILMASI



Marmara Bölgesi	2020 yılı Buğday Üretim Miktarı (Ton)	2021 yılı Buğday Üretim Miktarı (Ton)	2022 yılı Buğday Üretim Miktarı (Ton)	2023 yılı Buğday Üretim Miktarı (Ton)	2024 yılı Tahmini Buğday Rekoltesi (Ton)
	3.278.000	3.825.000	3.270.000	3.541.000	3.825.000
	2019 YILINA GÖRE %3 ARTIŞ GÖRÜLMÜŞTÜR	2020 YILINA GÖRE %17 ARTIŞ GÖRÜLMÜŞTÜR	2021 YILINA GÖRE %14 AZALMA GÖRÜLMÜŞTÜR	2022 YILINA GÖRE %8 ARTIŞ GÖRÜLMÜŞTÜR	2002 YILINA GÖRE %8 ARTIŞ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.



AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ (2024)



BİTKİ GELİŞİMİ



Marmara Bölgesi'nde buğday verimi uzun yıllara göre aynı seviyede, 2023 yılına göre de yaklaşık olarak **%8 ARTIŞ** beklenmektedir.





TEKİRDAĞ



EDİRNE



KIRKLARELİ



ÇANAKKALE

Bölgemizde 150'den fazla buğday çeşidi ekilmekle birlikte ağırlıklı olarak ekimi yapılan çeşitler aşağıdaki gibidir. Çeşitlerin bu kadar fazla olması nedeniyle sağlıklı buğday üretimi yapılamamakta ve daha önceden görülmeyen bazı hastalıklara dayanıklı tohumlar kullanılmadığı için bölgemizde verim kaybına sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple adaptasyon kabiliyeti yüksek çeşitlere yönelmek faydalı olacaktır.

Hamza	Krasunia
Aldane	Nina
Bereket	Nota
Bezostaja	Pehlivan
Dropia	Saraybosna
Edirne	Selimiye
Esperia	Syrena
Flamura-85	Tekirdağ
Gelibolu	Enola
Golia	Yubileynaya
Guadalupe	Rebelde

SÜNE MÜCADELESİ

Bu yıl doğrudan veya pas hastalığına karşı kullanılan zirai ilaçlarla karıştırılarak süneye karşı yapılan kimyasal mücadele faydasız ve yasaktır.

Trakya genelinde ilçe tarım müdürlüklerinin çalışmaları devam etmektedir. Ormanlık alanlarda süne görülmekle birlikte ova alanlarda da seyrek olarak bulunmaktadır.

İtalyan menşeli erkenci çeşitler de don sıkıntısı oldu %20 civarında kayıp olabilir.

Rus menşeli erkencilerde külleme ve mantar hastalığı görüldü ilaçlama ile hastalıklar giderildi.

Diğer çeşitler için Mayıs yağışları önemli yağışlar az olur ise sıkıntı yaşanabilir.



SÜNE BİLGİLENDİRME

(Geçtiğimiz 2 yılı değerlendirirsek)

- 2021 sonbaharında kışlakta sayılan ergin sayısı bir önceki yıla göre %11 azalış gösterdi
- 2022 sonbaharında kışlakta sayılan ergin sayısı bir önceki yıla göre %12 artış gösterdi
- 2022 ilkbaharında kışlakta sayılan ergin sayısı bir önceki yıla göre % 3 artış gösterdi
- 2023 ilkbaharında kışlakta sayılan ergin sayısı bir önceki yıla göre % 5 artış gösterdi
- 2022 yılında parazitlenmiş süne yumurtası oranı %23
- 2023 yılında parazitlenmiş süne yumurtası oranı %22
- 2022 yılında m2 deki nimf sayısı 10 adet
- 2023 yılında m2 deki nimf sayısı 8 a
- 2022 yılında kimyasal mücadele yapılan köy sayısı 27.2.2023 198
- 2022 yılında emgi oranı %0,5 - 2023 yılında %0,4

Özet ;

Kışlakta canlı kalabilen ergin süne sayısı iklim değişikliğine bağlı olarak artıyor,
Parazitoidler tarafından parazitlenen süne yumurta sayısı az da olsa azalıyor,
Süne nimflerinin aktif olduğu dönemde yağışlar arttığı için canlı kalabilen nimf sayısı azalıyor,
Nimf sayısı azaldığı için zarar gören emgili tane oranı azalıyor.

Not. Bu yıl buğday çok hızlı gelişti sürprizlere açık arazide ergin süne sayısı bu yıl çok fazla.

BÖLGEMİZİN GENEL DURUMU

- Bu sene bölgemizdeki ekim zamanı yaşanan olumsuz iklim koşulları (kuraklık ve sonra aşırı yağış) sebebiyle lokal alanlarda ekim hazırlığı yapılamamıştır. Ekimler bu sebeple bazı bölgelerde az olmuştur, fakat ekim yapılan tarlalarda dölleme ve dane dolum dönemindeki (kritik dönem) uygun yağışlar nedeniyle, rekolte de %8 ila % 10 arasında artış beklenmektedir.
- Lokal olarak ekim yapılamayan alanlara ise ekim zamanı ve bölge şartları nedeniyle ayçiçeği ekimi yapılmıştır.

TEŞEKKÜRLER

